

ARREBATO MZ

POLVO MOJABLE (WP)

FUNGICIDA PENETRANTE Y DE CONTACTO

CIMOXANILO 4% P/P (40 G/KG)
MANCOZEB 40% P/P (400 G/KG)
 CONTIENE SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO
 CONTIENE SODIUM METHYLENE POLYMETHYLNAPHTHYL SULPHONATE

ARREBATO MZ es un fungicida penetrante y de contacto, con acción preventiva y stopante (puede detener el desarrollo del hongo después de que éste haya penetrado en la planta). No se requiere repetir la aplicación si acontece una lluvia de intensidad moderada (menos de 10-15 l/m²) transcurrida más de 1 hora del tratamiento.

APLICACIONES AUTORIZADAS:

CULTIVO/ESPECIE	PLAGA/EFECTO	DOSIS
Vid	Mildiu y black rot	0,3% (300 gramos por 100 litros de agua).
Patata	Mildiu y alternaria	
Tomate	Mildiu, alternaria y septoria	
Cucurbitáceas	Mildiu	

ÉPOCA Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar en pulverización normal, se aconseja utilizar **ARREBATO MZ** preventivamente (antes de que el hongo haya penetrado en la planta), pudiendo ser aplicado, también, a los 2-4 días de producida la infección, para detener el desarrollo del hongo después de que éste haya penetrado en la planta.

En viña y parral hay que mantener a la planta protegida, principalmente durante el periodo comprendido entre los estados de grano tamaño guisante hasta el inicio del envero (cambio de color).

PRECAUCIONES:

Mojar bien y uniformemente la vegetación.

La persistencia de la protección fungicida de **ARREBATO MZ** es de 10 días, por lo que deberá mantenerse protegida la vegetación, en caso de persistir condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad (humedad y temperatura), con tratamientos sucesivos e intervalos de 10-15 días entre aplicaciones.

PLAZO DE SEGURIDAD:

Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados:

- Vid: 15 días.
- Vid de vinificación: 21 días.
- Patata: 15 días.
- Tomate: 3 días.
- Cucurbitáceas: 15 días.

NOTA: "Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima,...etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos...etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta".

I.R.O.P. y M.F. con el nº 21.494 y fabricado por SIPCAM INAGRA, S.A.,
 C/ Prof. Beltrán Báuena, 5 - 46009 Valencia
 Distribuido por: PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

