

# COPIST H

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

FUNGICIDA BACTERICIDA

HIDRÓXIDO CÚPRICO (EXP. EN CU) 20 % P/P (200 G/KG)

## APLICACIONES AUTORIZADAS:

Tratamientos fungicidas-bactericidas.

Aplicar en pulverización normal en cultivos de:

Cultivo	Plaga / Efecto	Dosis	Plazo de seguridad
Olivar	Repilo y bacteriosis	0.35% - 0.52% (350 - 520 g/hl)	15 días
Tomate (Invemadero)	Mildiu y bacteriosis	0.35% - 0.52% (350 - 520 g/hl)	3 días
Tomate (aire libre)		0.35% - 0.52% (350 - 520 g/hl)	10 días
Vid		0.35% - 0.52% (350 - 520 g/hl)	15 días

## OBSERVACIONES

En Tomate efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 1.800 l/ha y un máximo de 7,5 kg de cobre inorgánico por campaña.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de vid. No aplicar durante la floración de la vid.

## ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 25.277

Titular: AMBECHEM LTD. - 82 Warren Road, Blundellsands, Liverpool L23 6UG - Reino Unido

Fabricante: AGRI ESTRELLA S. de R.L. de C.V. - Retorno Alfonso Reyes No. 331 - 31109 Chihuahua, MÉXICO

Distribuidor: PROPLAN-PLANT PROTECTION CO., S.L. - C/ Valle del Roncal, 12. 1ª - 7 - 28232 Las Rozas (Madrid)

Envase  
**5**  
kg