

# KATANGA WP®

POLVO MOJABLE (WP)

FUNGICIDA SISTÉMICO CONTRA FITOFTORA

FOSETIL-AL. 80% P/P (800 G/KG.)

**KATANGA WP®** es un fungicida con sistemía ascendente y descendente. La sistemía descendente le confiere un carácter único para combatir por vía foliar las enfermedades del cuello, tronco y raíces producidas por la fitoftora (como la gomosis infecciosa de los naranjos).

**KATANGA WP®**, además de comportarse como un fungicida tradicional, tiene un modo de acción original ya que una vez aplicado, metabolizado y distribuido en el interior de la planta, provoca que intervengan los mecanismos de autodefensa de la misma. Cuando el hongo de la fitoftora intenta infectarla, actúa igual que las plantas que son resistentes a la fitoftora por naturaleza.

**APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS:**

Aplicar por pulverización foliar. Para conseguir una actuación eficaz del producto, efectuar las aplicaciones en periodo de crecimiento activo de la planta.

• **CÍTRICOS:** (*Phytophthora spp.*)

En plantaciones, siguiendo un programa de un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 30 a 150 días entre aplicaciones, a dosis de 0,25-0,3 kg/hl equivalente a 2,5 a 4,5 kg/ha y un volumen de caldo de 1.000 a 1.500 L/ha.

• **FRUTALES DE PEPITA:** (*Phytophthora spp.*)

En plantaciones, siguiendo un programa de un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 30 a 150 días entre aplicaciones, a dosis de 0,25-0,3 kg/hl equivalente a 2,0 a 3,6 kg/ha y un volumen de caldo de 800 a 1.200 L/ha.

• **VID:** Mildiu (*Plasmopara viticola*)

En cultivo alto a una dosis de 0,25-0,3 kg/hl equivalente a 0,75 a 3,3 kg/ha y un volumen de caldo de 300 a 1.100 L/ha, siguiendo un programa de un máximo de 4 tratamientos comenzando en floración y posteriormente otras 3 espaciadas entre 10-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la enfermedad, es conveniente, en las aplicaciones posteriores a la floración, la mezcla con fungicidas de contacto (mancozeb o folpet).

**PREPARACIÓN DEL CALDO:**

Una vez lleno el depósito del pulverizador con agua hasta la mitad, verter lentamente el producto sobre la superficie del líquido en reposo. Dejar que el polvo se impregne por gravedad y poner en funcionamiento el sistema de agitación, completando con agua el resto del depósito.

**PRECAUCIONES:**

Compatible con Mancozeb 80% WP. Incompatible con Dicofol, aceite mineral y productos cúpricos. En caso de realizar un tratamiento con aceite deberá transcurrir una semana entre el tratamiento con **KATANGA WP®** y el aceite. Incompatible con abonos foliares que contengan Nitrógeno mineral.

**PLAZO DE SEGURIDAD:**

Intervalo de tiempo, mínimo, que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados.

- 15 días en cítricos y frutales de pepita.
- 28 días en vid.

**ADVERTENCIA AL USUARIO:**

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

I.R.O.P. y M.F. con el nº 22.730

Titular y Fabricante: PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

© Marca registrada de PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

