

# ORZOWEY 25EW

EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA (EW)

FUNGICIDA ANTIOIDIO SISTÉMICO

## TEBUCONAZOL 25% P/V (250 G/L)

CONTIENE LACTATO DE 2-ETILHEXILO (CAS: 186817-80-1),  
N-PROPILO-S-LACTATO (CAS: 53651-69-7),  
DIOCTIL SULFOSUCCINATO SÓDICO (CAS: 577-11-7)

ORZOWEY 25% EW es un fungicida sistémico de amplio espectro, con efecto preventivo, curativo y erradicante. Se caracteriza por su alta eficacia en el control de hongos causantes de enfermedades como oidios, botritis, royas, moteados, monilia y otros.

### APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS:

| Cultivo            | Enfermedad                                    | Dosis   | Nº máximo de tratamientos e intervalo mínimo | Plazo de seguridad (días) |
|--------------------|---|---|--|---------------------------|
| Pepino y calabacín | Botritis, cladosporiosis y esclerotinia       | 0,04-0,1% (40-100 ml/100 litros de agua)<br>Máximo 0,5 l/ha | 3<br>(7 días)                                | 3                         |
| Pimiento           |   |   | 2<br>(7 días)                                | 3                         |
| Tomate             |   | 0,04-0,1% (40-100ml/100 litros de agua)<br>Máximo 1 l/ha    | 3<br>(7 días)                                | 3                         |
| Berenjena          | Botritis, cladosporiosis, esclerotinia y roya | 0,04-0,1% (40-100 ml/100 litros de agua)<br>Máximo 1 l/ha   | 3<br>(7 días)                                | 3                         |
| Judías verdes      | Botritis, esclerotinia y roya                 |   | 1  | 14                        |
| Ajo y cebolla      | Botritis, cladosporiosis, esclerotinia y roya | 2 l/ha  | 1  | NP*                       |
| Arroz              | Piricularia y helmintosporium                 | 1 l/ha  | 1  | 35                        |
| Trigo y cebada     | Oidio, royas, septoria y helmintosporium      | 1 l/ha  | 2<br>(14 días)                               | 35                        |
| Vid                | Oidio y botritis                              | 0,04-0,1% (40-100 ml/100 litros de agua)<br>Máximo 0,4 l/ha | 2<br>(14 días)                               | 21                        |

\*NP: No procede (ver época y modo de empleo)

### ÉPOCA Y MODO DE EMPLEO

En general, aplicar en pulverización normal.

Ajo y cebolla: Aplicar inmediatamente después de la siembra en pulverización al suelo o incorporándolo al agua de riego a las dosis indicadas.

### PRECAUCIONES:

Es conveniente la mezcla de **ORZOWEY 25% EW** con otros fungicidas de acción y espectro complementario con la finalidad de evitar la aparición de resistencias que pudieran reducir la eficacia del producto.

**ORZOWEY 25% EW** es activo sobre diversas royas de los géneros Puccinia y Uromyces.

### ADVERTENCIA:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

I.R.O.P.F. con el nº 24.814

Titular y fabricante: SIPCAM INAGRA, S.A. - Prof. Beltrán Bágüena, 5 - 46009 VALENCIA

Distribuido por: PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

®Marca registrada por: PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

|                              |                               |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Botella<br><b>1</b><br>litro | Botella<br><b>5</b><br>litros | Caja<br><b>4x5</b><br>litros | Caja<br><b>10x1</b><br>litros |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|