

SPINAKE® MICROS B

MEZCLA SÓLIDA

MEZCLA SÓLIDA CON MICRONUTRIENTES
(Fe, B, Cu, Mn, Mo y Zinc) QUELATADOS

COMPOSICIÓN

- Boro (B).....3,00% en forma de mineral
- Cobre (Cu).....0,40% en forma de quelato EDTA
- Hierro (Fe).....7,50% en forma de quelato EDTA
- Manganeso (Mn).....5,00% en forma de quelato EDTA
- Molibdeno (Mo).....0,20% en forma de mineral
- Zinc (Zn).....5,00% en forma de quelato EDTA



Distribuido por PROPLAN Plant Protection Company, S.L.

® Marca registrada por PROPLAN Plant Protection Company, S.L.

 **PROPLAN**
Plant Protection Company, S.L.

C/ Valle del Roncal, 12. 1ª - 7
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 108 165
Fax: 91 626 60 99
www.proplanppc.es

SPINAKE[®] MICROS B

MEZCLA SÓLIDA

DESCRIPCIÓN

Corrector de carencia de Hierro (Fe), Boro (B), Cobre (Cu), Manganeseo (Mn), Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn) en forma de quelatos EDTA.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

RIEGO POR GOTEO

- **HIDROPONIA:** 3,5- 5,5 g/hl de agua de riego. Repetir la aplicación cada 7-9 días. Preparación previa de 3,5-5,5 Kg/1000L de solución madre 100 veces concentrada, utilizando 1L de solución madre por 100L de agua de riego.
- **CULTIVOS LEÑOSOS-CITRICOS-FRUTALES-VID-OLIVAR:** 2-3 Kg/Ha por aplicación. Comenzar al inicio de la brotación. Realizar 2-4 aplicaciones según las necesidades.
- **HORTICOLAS-FRESAS-ORNAMENTALES:** 1,5-2 Kg/Ha por aplicación. Comenzar al inicio de actividad vegetativa. Realizar 2-4 aplicaciones según las necesidades.
- **FERTIRRIGACION CONTINUA:** 20 -25 g/m³ de agua. Repetir según necesidades del cultivo.
- **SUSTRATO PARA SEMILLEROS:** 300 g por 1000 L de sustrato. Realizar una mezcla homogénea con el material de sustrato.

APLICACIÓN FOLIAR

- **CULTIVOS LEÑOSOS-CITRICOS-FRUTALES-VID-OLIVAR:** 150 g/hl con un gasto máximo de 0,7-1 Kg/Ha en plantaciones adultas. Comenzar al inicio del ciclo vegetativo con suficiente masa foliar. Repetir según necesidades del cultivo. En caso de carencia declarada repetir a los 20 días.
- **HORTICOLAS y CULTIVOS ANUALES:** 75-100 g/hl con un gasto máximo de 300-500 g/Ha en cultivos adultos. Comenzar al inicio del ciclo vegetativo con suficiente masa foliar. Repetir según las necesidades del cultivo. En caso de carencia declarada repetir a los 20 días.

PRECAUCIONES

En caso de mezcla con cualquier producto se recomienda hacer una pequeña prueba previa.