

TOSCANA®

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

HERBICIDA SELECTIVO DE TRIGO Y CEBADA

TRIBENURON METIL 75% P/P (750 G/KG)

TOSCANA es un herbicida que se usa en post-emergencia de trigo y cebada para el control de malas hierbas de hoja ancha.

TOSCANA se absorbe principalmente por las hojas, en menor medida por las raíces, y se trasloca con rapidez, tanto acropétala como basipétala, a los puntos de desarrollo de la planta impidiendo la división celular y el crecimiento de aquella. Como consecuencia las hierbas mueren o permanecen enanizadas perdiendo así su capacidad de competir con el cultivo. El crecimiento de la hierbas sensibles se detiene pocas horas después del tratamiento con síntomas visibles, como amarilleo, necrosis y muerte que pueden manifestarse de 1 a 3 semanas desde la aplicación en función de la temperatura.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Uso	Mala hierba	Dosis g/ha	Nº aplicaciones	Volumen caldo
Trigo	Dicotiledóneas	10-20	1	200-330 L/ha
Cebada	Dicotiledóneas	10-20	1	200-330 L/ha

CONDICIONES GENERALES DE USO

Aplicar en pulverización normal con tractor, en postemergencia, a partir de las 3 hojas desplegadas del cereal y hasta el final del ahijado, en una aplicación única con un volumen de caldo de 200-330 L/ha. No aplicar en otoño.

Para garantizar un control eficaz de las malas hierbas se recomienda realizar la aplicación con las hierbas en crecimiento activo, en post-emergencia temprana (2-6 hojas).

Emplear la dosis más baja para controlar las malas hierbas más sensibles en los primeros estadios.

RECOMENDACIONES GENERALES

Contra *Anethum graveolens*, *Bifora radians*, *Capsella bursa pastoris*, *Diplotaxis spp.*, *Matricaria chamomilla*, *Myagrum perfoliatum*, *Oxalis cernua*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Fallopia convolvulus*, *Rapistrum rugosum*, *Sinapis arvensis*, *Stellaria media*, se recomienda aplicar de 10-15 g/ha.

Contra *Centaurea cyanus*, *Fumaria officinalis*, *Geranium dissectum*, *Lamium purpureum*, *Ranunculus spp.*, *Rumex spp.*, *Scandix pecten veneris*, *Veronica persica*, *Vicia spp.*, *Viola tricolor* se aconseja una dosis de 15 g/ha con un mojanete no iónico al 0.1%.

En caso de infestaciones de *Chrysanthemum segetum* y *Raphanus raphanistrum* aplicar **TOSCANA** con una dosis de 20 g/ha con un mojanete no iónico al 0.1%.

PLAZO DE SEGURIDAD:

No procede por época de aplicación.

PREPARACIÓN DEL CALDO

TOSCANA, a la dosis establecida, debe disolverse en un cuarto del tanque del pulverizador, manteniendo el agitador en movimiento; llevar a volumen el tanque y llevar a cabo el tratamiento manteniendo en funcionamiento el agitador. Utilizar el caldo el mismo día de su preparación.

ADVERTENCIAS

Durante la aplicación del tratamiento evitar sobre-exposiciones y cerrar el pulverizador durante paradas y cambios de dirección. Inmediatamente después del tratamiento es importante eliminar cualquier resto del producto en el tanque y en la bomba, actuando de la siguiente manera:

- Vaciar el depósito; lavar el depósito, la bomba y las barras con agua limpia y vaciar nuevamente.
- Llenar el depósito con agua limpia; añadir 0.5 L de amoníaco (solución amoniacal para uso doméstico al 6%) por cada hl de agua. Enjuagar el interior de la bomba y de las barras manteniendo el agitador en funcionamiento durante 10 minutos; vaciar nuevamente.
- Repetir el lavado con amoníaco como descrito en el punto b).
- Eliminar cualquier traza de amoníaco enjuagando completamente el depósito, la bomba y las barras con abundante agua limpia.
- Lavar los filtros y las boquillas por separado con una solución amoniacal al 6%.

Sobre variedades de trigo y cebada de reciente introducción se aconseja una prueba previa de selectividad.

Con el objetivo de evitar o retrasar la aparición de malas hierbas resistentes a un herbicida, se aconseja alternar productos que tengan diferentes mecanismos de acción.

COMPATIBILIDAD

En caso de mezcla con otros productos se recomienda realizar una prueba previa.

ATENCIÓN

- De uso exclusivo para los usos y condiciones indicados en esta etiqueta.
- Quien use el producto es responsable de los eventuales daños que pueden derivarse de un uso inapropiado del preparado.
- El cumplimiento de todas las indicaciones es indispensable para asegurar la eficacia del tratamiento y para evitar daños en plantas, personas y animales.
- No realizar aplicaciones aéreas.
- No contaminar otros cultivos, alimentos, bebidas y cursos de agua.
- No aplicar con viento.

NOTA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

I.R.O.P. y M.F. con el nº ES-00088

Registrado y fabricado por PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

Distribuido por: PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

© Marca registrada por PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

