

WENDOLIN® FLOW

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

FUNGICIDA ACARICIDA DE CONTACTO

AZUFRE 80% P/V (800 G/L)

WENDOLIN® FLOW es un fungicida-acaricida de contacto adecuado para combatir todas las formas de oidio. Posee un excelente efecto secundario sobre ácaros en general (arañas rojas y eriófitos).

APLICACIONES AUTORIZADAS:

Cultivo	Plaga	Dosis
Frutales de hoja caduca y frutales subtropicales	Araña roja, eriófitos y oidio	0,2%-0,5%
Hortícolas	Ácaros, araña roja, oidio y oidiopsis	
Cereales	Oidio	
Olivo	Araña roja y negrilla	
Vid	Araña roja, erinosis y oidio	
Remolacha azucarera, lúpulo y ornamentales leñosas	Araña roja y oidio	

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar en pulverización normal, según temperatura ambiental, cultivo, época de tratamiento, etc.

Contra oidio de la vid: Para un primer tratamiento, cuando la temperatura es baja, el producto se emplea a dosis de 200 a 250 cc por cada 100 litros de agua. Con el aumento gradual de la temperatura, según la época, reducir la dosis a un mínimo de 200 cc por cada 100 litros de agua.

Para árboles frutales: Aplicar de 400 a 500 cc por cada 100 litros de agua, antes de floración, siguiendo un tratamiento postfloral de 300 a 400 cc/hl. En los tratamientos sucesivos ir rebajando la dosis hasta un mínimo de 200 cc por cada 100 litros de agua.

Dado que en **viticultura** prácticamente coincide la época de la lucha contra el oidio y la peronospora o mildiu, es siempre aconsejable añadir el **WENDOLIN® FLOW** a un compuesto órgano-cúprico o bien al sulfato de cobre.

El producto puede verterse directamente en el depósito de la cuba o depósito de pulverizar cuando esté lleno hasta la mitad con el agitador en marcha, llenándolo totalmente después.

PRECAUCIONES:

En la variedad de manzano "Golden delicious", y en determinadas condiciones climáticas, pueden producirse algunas quemaduras en hojas, por lo que en esta variedad se aconseja su empleo solo, en aplicaciones matinales y a la dosis de 0,2%.

No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado altas. Observar precauciones en cultivos de frutales sensibles como albaricoquero, manzano y peral. No mezclar con aceites ni con productos de reacción alcalina. No deberá efectuarse tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores al empleo de **WENDOLIN® FLOW**.

No aplicar el producto en alcachofa ni en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

PLAZO DE SEGURIDAD:

Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados: No procede establecer plazo de seguridad para ningún cultivo.

NOTA: "Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima,...etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos...etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta".

I.R.O.P. y M.F. con el nº 16.419 por SIPCAM IBERIA, S.L.,
C/ Prof. Beltrán Báuena, 5-11 - 46009 Valencia, con nombre Suffrevit®.
Fabricado por: SIPCAM INAGRA, S.A. - 46009 Valencia.
Distribuido por: PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.
®Marca registrada por: PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.

