

CRUCETA X

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

FUNGICIDA BACTERICIDA

HIDRÓXIDO CÚPRICO (EXP. EN CU) 25 % P/P (250 G/KG)

Contiene poliglicol éter de alcohol graso (CAS 9043-30-5)

APLICACIONES AUTORIZADAS:

Fungicida/bactericida de contacto a base de cobre que inhibe el desarrollo y crecimiento de enfermedades causadas por patógenos fúngicos y bacterianos. Aplicar en cultivos al aire libre mediante pulverización normal con tractor y manual con lanza. En invernadero aplicar mediante pulverización manual con lanza.

Uso	Agente	Dosis %	No. Apli.	Intervalo	Caldo	Forma y época de aplicación
Ajos, cebolla y chalote	Alternaria, antracnosis, bacteriosis y mildiu	0.3	3-4	7-14	1000 L/ha	Aplicar desde 3ª hoja claramente visible hasta inclinación de follaje (BBCH 14-47)
Berenjena y tomate	Bacteriosis y mildiu	0.3	3-4	7-14	1000 L/ha	Aire libre e invernadero: aplicar desde 3ª hoja desplegada hasta madurez completa (BBCH 15-89)
Cucurbitáceas piel comestible y no comestible	Mildiu	0.2	3-4	7-14	1000 L/ha	Pepino, calabacín y pepinillos (aire libre e invernadero). Melón, sandía y calabaza (solo aire libre): aplicar desde el principio del desarrollo de las hojas hasta madurez completa (BBCH 10-89)
Frutales de hueso	Abolladura	0.3	2-4	14-21	1000 L/ha	Aplicar en prefloración (BBCH 53-95)
Frutales de pepita	Moteado	0.3	2-4	7-21	1000 L/ha	Aplicar en prefloración (BBCH 53-91)
Olivo	Repilo, antracnosis, tuberculosis	0.3	1-3	14-21	1000 L/ha	Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta que aumente la coloración de los frutos (BBCH 10-85)
Patata	Mildiu	0.3	3-4	7-14	1000 L/ha	Aplicar desde 3ª hoja desplegada hasta que las bayas de la fructificación de 1º grado estén de color ocre o amarronado (BBCH 15-85)

PLAZOS DE SEGURIDAD

Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados:

- Berenjena y tomate: 10 días (industria) y 3 días (fresco)
- Olivo: 14 días.
- Ajos, cebolla, chalote, cucurbitáceas de piel no comestible: 3 días
- Cucurbitáceas de piel no comestible y patata: 7 días
- Frutales de hueso y frutales de pepita: NP.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos...etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

I.R.O.P. y M.F. con el No. 25.276

Titular: Albaugh UK Ltd.

Fabricante: AGRI ESTRELLA S. de R.L. de C.V.

Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.

www.proplanppc.es

Envases: 5 kg

C/Valle del Roncal, 12. 1ª - 7 - 28232 Las Rozas
(Madrid) Tel.: 902 108 165 - Fax: 91 626 60 99

 **PROPLAN**
Plant Protection Company, s.l.