

TOSCANA®

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

HERBICIDA SELECTIVO DE TRIGO Y CEBADA

TRIBENURON METIL 75% P/P (750 G/KG)

TOSCANA® es un herbicida que se usa en postemergencia de trigo y cebada para el control de malas hierbas de hoja ancha.

TOSCANA® se absorbe principalmente por las hojas, en menor medida por las raíces, y se trasloca con rapidez, tanto acrópeta como basípetamente, a los puntos de desarrollo de la planta impidiendo la división celular y el crecimiento de aquella. Como consecuencia las hierbas mueren o permanecen enanizadas perdiendo así su capacidad de competir con el cultivo.

El crecimiento de las hierbas sensibles se detiene pocas horas después del tratamiento con síntomas visibles, como amarilleo, necrosis y muerte que pueden manifestarse de 1 a 3 semanas desde la aplicación en función de la temperatura.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Uso	Agente	Dosis (g/ha)	No. Aplicaciones	Volumen de caldo
Trigo y Cebada	Dicotiledóneas	10-20	1	200-330 L/ha

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal con tractor, en postemergencia, a partir de las 3 hojas desplegadas del cereal y hasta el final del ahijado, en una aplicación única con un volumen de caldo de 200-330 L/ha. No aplicar en otoño.

Para garantizar un control eficaz de las malas hierbas se recomienda realizar la aplicación con las hierbas en crecimiento activo, en postemergencia temprana (2-6 hojas).

Emplear la dosis más baja para controlar las malas hierbas más sensibles en los primeros estadios.

RECOMENDACIONES GENERALES

Contra *Anethum graveolens*, *Bifora radians*, *Capsella bursa pastoris*, *Diploaxis spp.*, *Matricaria chamomilla*, *Myagrum perfoliatum*, *Oxalis cernua*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Fallopia convolvulus*, *Rapistrum rugosum*, *Sinapis arvensis*, *Stellaria media*, se recomienda aplicar de 10-15 g/ha. Contra *Centaurea cyanus*, *Fumaria officinalis*, *Geranium dissectum*, *Lamium purpureum*, *Ranunculus spp.*, *Rumex spp.*, *Scandix pecten veneris*, *Veronica persica*, *Vicia spp.*, *Viola tricolor* se aconseja una dosis de 15 g/ha con un mojante no iónico al 0.1%.

En caso de infestaciones de *Chrysanthemum segetum* y *Raphanus raphanistrum* aplicar TOSCANA® con una dosis de 20 g/ha con un mojante no iónico al 0.1%.

PLAZO DE SEGURIDAD

Intervalo de tiempo, mínimo, que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados.: No procede por época de aplicación.

PRECAUCIONES

- Durante la aplicación del tratamiento evitar sobreexposiciones y cerrar el pulverizador durante paradas y cambios de dirección. Inmediatamente después del tratamiento es importante eliminar cualquier resto del producto en el tanque y en la bomba.
- Sobre variedades de trigo y cebada de reciente introducción se aconseja una prueba previa de selectividad.
- Con el objetivo de evitar o retrasar la aparición de malas hierbas resistentes a un herbicida, se aconseja alternar productos que tengan diferentes mecanismos de acción.

COMPATIBILIDAD

En caso de mezcla con otros productos se recomienda realizar una prueba previa.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

I.R.O.P. y M.F. con el No. ES-00088

Titular y Fabricante: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.

Marca registrada por PROPLAN Plant Protection Company, S.L.

www.proplanppc.es

Envases: 100 g.

C/Valle del Roncal, 12. 1ª - 7 - 28232 Las Rozas
(Madrid) Tel.: 902 108 165 - Fax: 91 626 60 99

 **PROPLAN**
Plant Protection Company, s.l.